傷科彙纂

傷科彙纂卷之七

蕭山晴川胡廷光秷山甫纂輯

用藥總論

秷山曰傷科血病四物湯爲君失亡補益瘀滯攻行蓋聞內蓄不散治分三部上宜犀角地黃湯中必桃仁承氣湯瘀在下者柢當湯通利外感有邪醫隨四季春用五積散香蘇飲夏以五苓散香薷飲秋擬藿香正氣散冬則雙解散且如損傷發熱須別陰陽陰虛者當歸補血湯陽衰者四君子湯加附子生薑挾表體疼虛實宜

詳形實者。疎風敗毒散。氣弱者。羌活乳香湯。初患之時。審症擇方。瘀凝昏憒者。花乳石散。痰迷心悶者蘇合香丸。血瘀泛注者葱熨法。亡血過多者聖愈湯。煩躁而不眠者。加味歸脾湯。眩暈而嘔脹者。六君子湯。三五日間。變症多端。喘咳者。參蘇二味參蘇飲十味參蘇飲。口渴者竹葉石膏湯。竹葉黃芪湯。血熱發躁。仍用當歸補血湯。氣虛下陷。補中益氣湯。升提胃火作嘔。加梔芩清胃散。寒凉尅伐。六君子湯。補脾。過此之後。更宜調理。嘔吐黑汁。分百合散加味芎歸湯。肝火熾盛。分加味逍遙散。

加劑、血蘊內嘔兮、四物湯加柴胡黃芩、元氣虛脫兮、人參獨參湯味或以筋骨作痛、肝腎之傷、六味地黃丸肌肉作痛、榮衛之滯、復元通氣散火盛而痛、小柴胡湯加梔子黃連、濕痰爲祟、二陳湯加味、頭痛兮當歸補血湯安神湯補中益氣湯、胸痛兮四君子湯四物湯歸脾湯然腰痛者、瘀留血瀝、破血散舒筋散、虛者四物湯、實者桃仁、承氣湯而陰疼者、白津便淋、小柴胡湯應肝經鬱火、加山梔黃連生軍、即如脇肋脹疼、分其通塞、不通者瘀聚復原活血湯便通者、肝火、小柴胡湯梔子青皮下

後腹痛察其陰陽陽傷者惡寒十全大補湯濟陰傷者發熱四物湯加白朮人參若夫秘結者潤腸丸導滯湯血虛便秘者玉燭散調和作瀉者清暑益氣湯清燥湯腎衰脾泄者破故紙肉菓青腫不潰皆虛弱外熨內托新肉不生因虧乏峻加溫補至於破傷風分表裏發痙又辨柔剛柔飲白朮湯而剛則葛根湯表服羌活防風湯而裏用大小芎黃湯羌麻湯療表裏之和劑玉真散醫是症之總方始終秘訣養血理傷短句義難盡悉當於長篇究詳

傷損論曰夫傷損必須求其源看其病之輕重審其損之淺深凡人一身之間自頂至足有斫傷打傷跌傷及諸刄傷者皆有之凡此數證各有其說有當先表裏而後服損藥者爲醫者當循其理治之然醫者意也不知意者非良醫也或者禀性愚昧不能觀其證之輕重明其損之淺深未經表裏先服損藥誤人多矣有因此痰涎上攻有因此大小臟腑閉結差之毫釐謬以千里所謂醫不三世不服其藥信哉

劉宗厚曰打撲金刃損傷是不因氣動而病生於外外受有形之物所傷乃血肉筋骨受病非如六淫七情爲病有在氣在血之分也所以損傷一證專從血論但須分其有瘀血停積而亡血過多之證蓋打撲墜墮皮不破而內損者必有瘀血若金刃傷皮出血或致亡血過多二者不可同法而治有瘀血者宜攻利之若亡血者兼補而行之又察其所傷有上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊唯宜先逐瘀血通經絡和血止痛然後調氣養

血補益胃氣無不効也
證治準繩用藥訣云凡樹木壓或自高處顛下者
此等傷皆驚動四肢五臟必有惡血在內專怕惡
心先用清心藥打血藥及通大小腸藥次第服之
臨服時加童子小便入藥內立効如專用通利大
小腸恐作隘塞利害之甚要先清心而後通利自
然無昏悶煩躁無惡血污心等患以次用止痛藥
服之即止或二十五味藥加減用之
凡跌撲傷刀石傷諸般傷至重者先服清心藥次

服童子小便、再服去血藥、或被傷而血未結、打從瘡口出者、或結在內用藥打入大腸、即時瀉出者、或結在外、用藥打散者、或歸上膈、打從口中吐出者、則用薑湯、燈心湯、調二十五味藥服之、薄荷湯亦可、

凡打撲傷損、折骨出臼者、便宜用何首烏散服之若發熱體實之人、用疎風敗毒散、若惡寒體弱之人、用五積交加散、後用黃白紅黑、四種末子、及活血丹、補損丹等藥調理、

凡折骨出臼者不宜用下瘀血之藥及通利大便之藥只宜踈風順氣和血定痛補損而已

凡打撲砍磕從高跌墮瘀血攻心不能言語者用獨聖散及破血藥下去瘀血即能言語次宜臨證詳治之

凡打撲跌墮傷於脇下瘀痛不可忍者先用破血藥及獨聖散次以復元活血湯調理

凡打撲跌墮損破皮肉紫黑色者先用破血藥次用獨聖散又次用清上瘀血湯消下破血湯

凡打撲損傷、嘔吐惡血汁者、先用獨聖散、次用百合散、又次用生料四物湯、加硬骨牛乳根、加減調理、

凡打撲刀斧斫磕等傷、破皮損肉、血出去多、頭目眩暈者、先用川當歸、大川芎、煎水服、次加白芍藥、熟地黃、續斷、防風、荊芥、羌獨活、南星、煎水、加童便和服、則可、不可用酒、如血出少、內有瘀血者、以生料四物湯一半、獨聖散一半、煎水服、未破皮肉者、加酒和服、

凡打撲刀斧斫磕成傷破風痛不可忍者牙關緊急角弓反張者用生南星防風等分爲末米泔調塗患處又用熱酒童便各半調連進三服即甦次用踈風敗毒散調治之

凡刀斧砍磕傷破陰囊皮者先服獨聖散次服止痛藥內有瘀血者用破血藥

凡刀斧傷破肚皮腸出者先用清心藥加童便和服及用獨聖散次用止痛藥如血出過多先用當歸川芎水煎服次加白芍藥熟地黃羗活獨活防

風荊芥白芷續斷水煎調乳香沒藥末和服之

凡傷損藥中不可缺乳香沒藥此藥極能散血止痛

凡跌磕閃肭脫臼者不可便用自然銅久後方可用之折骨者宜便用之若不折骨不碎骨則不可用修合諸損藥皆要去之乃自然銅必用火煉然新出火者其火毒與金毒相煽夾香熱藥毒雖有接骨之功其燥散之禍甚於刀劍戒之

凡墮傷內有瘀血者腹脹滿而痛或胸脇滿宜用

破血藥、清心藥、及通利之、自然而愈、痛不止者、用
獨聖散服之効驗、如更不止者、用止痛藥大効、
凡金刄所傷、從高跌墮、皮肉破損、出血過多、此宜
止痛兼補、爲先、宜當歸補血湯、若皮肉不破損者、
宜作瘀血停積治之、先以獨聖散、次以破血藥、隨
證加減、續後痛不止者、用止痛藥調理、
凡損傷、妙在補氣血、俗工不知、惟要速効、多用自
然銅、恐成痼疾也、初傷只用蘇木活血、黃連降火、
白术和中、童便煎服、在下者可下瘀血、但先須補

托在上者宜飲韮汁或和粥吃切不可飲冷水血見寒則凝但一絲血入心即死

凡老人墮馬腰痛不可轉側者先用蘇木人參黃芪川芎當歸陳皮甘草煎服次以前藥調下紅黑黃白四末子及活血丹補損丹調理

凡杖打悶胸疼痛皆滯血證宜破血藥下之痛不可忍則傷血故也宜清心藥更不止用獨聖散

凡損傷大小便不通未可便服損藥蓋損藥性熱又用酒服澀秘愈甚看患人虛實實者用破血藥

加木通。尚未通。加芒硝。虛者以四物湯加枳殼麻仁桃仁、滑腸之類。虛人不可下者。四物湯。加穿山甲。

凡服損藥。不可吃冷物。魚牛肉。若喫牛肉。痛不可治。瘟猪肉。母猪肉。尤不可喫。切記之。

凡損藥內用酒者。不問紅白。只忌灰酒。且重傷不可便用酒。恐反發氣。或作腹脹胸滿。切記切記。

凡損藥其性必熱。能生氣血。以接骨也。更忌用火炙。如敷藥不効。服藥亦不効。

凡損傷不可服草藥服之所生之骨必大不得入臼要相兼君臣藥服則可加溫補氣血藥同煎更妙

凡打傷在兩脇兩胸兩肚兩肋却用通氣通血清心藥又看病人虛實不同虛者通藥須兼補藥放緩且用貼藥在前通藥在後

凡用通藥反不通者後用順氣藥腹肚全無膨脹服而得安此爲不干血作乃是氣閉不通如腹肚果有血作一通便下亦須以順氣兼之庶胸膈肚

腹不致緊悶氣順後却用損藥

凡人醉卧跌牀下腳背疼痛不可屈伸用損藥不効服黑豆酒数日愈豆能下氣所損輕也

凡小兒跌櫈角上用蘿蔔子煎服愈亦順氣也

凡損傷盤時先用熱酒磨草烏服一二盞方盤時氣絶用蘇合香丸須甦未甦以黑豆防風甘草黄連水煎冷服或苡草擂水服不可用鹽解之若吐加生薑汁

右皆專科用藥之法人有虛實不可一律而施耶

如末條整時先服草烏酒、整而氣絶、灌以蘇合香丸、走竄之劑、末甦、又以冷藥灌之、若施之氣虛之人、慘於加刃矣、惟薛氏法量證施治、專於內補、可以導用、學者宜審焉。

耀山曰、內治既明、外敷宜晰、皮開肉綻兮封口、藥血流不止兮止血、藥筋脉斷兮白膠香、散骨髎脫兮跌打膏藥貼、萬靈膏、接骨膏治骨節之碎析、消腫膏、抑陽散治身體之腫凸、堅硬不消、須用回陽膏、肌肉不生、還須太乙膏、若遇腦殼破損、混元膏、定痛膏、如遇眼目青腫、生

地黃散可滅。顴顋損傷者。含以畢茇散。嘴唇破碎者。塗以截血膏。蒺藜固齒散。療跌磕之鬬齒。雞子皮含護。醫咬割之斷舌。鼻傷者以塞鼻丹。耳落者以耳綴法。咽喉自刎破。忙將線縫合。雜以雞絨毛外掞花乳石散。腹破腸出者。縫以麻縷桑皮。囊開丸脫者。貼以喜子壁錢金毛狗脊。箭刺入肉。鼠腦象牙屑。破傷風患。葱熨法須熱。杖瘡臀黑。切忌寒凉。敷署夾棒踵傷法。要破瘀活血。百症千方。概難盡說。謬敘俚言數句。聊為初學之訣。

證治準繩云。凡腦骨損傷。皮不破者。用退腫膏敷

貼若皮破肉損者先用封口藥掞之外以散血膏貼之若血流者用止血藥掞之

凡面目傷青黑色用一紫散敷或紫金膏貼傷重者用補肉膏敷貼

凡兩鼻孔跌磕傷開孔竅者用封口藥掞傷處外以散血膏貼之退腫

凡耳斫跌打落或上脫下粘或下脫上粘內用封口藥掞外用退腫敷貼

凡唇口刀斧斫磕跌墮等傷破皮傷肉者先用桑

白皮線縫合以封口藥塗敷次以散血膏敷貼牽住所封之藥不令開落或用雞子黃油塗次以金毛狗脊毛薄掞於外仍塗封口藥抹之次日以茶清洗淨掞末藥一日換一次至八日剪去線又掞末藥

凡顛頰顴刀斧斫磕跌墮等傷破皮肉者用封口藥填瘡口外以散血膏敷貼或跌磕稍傷未破皮肉者用補肉膏敷貼

凡戳耍誤割斷舌頭未全斷者用封口藥敷一日

換二三次藥七八日全安、

凡齒牙被人打跌砍磕落者、只用補肌散掞之、

凡牙斷跌磕斫傷、齒未動者、用芙蓉膏末掞、如齒動者、用蒺藜根燒存性為末、常揩擦之即牢、

凡割喉者、以絲線先縫內喉管、後縫外頸皮、用封口藥塗敷、外以散血膏敷貼、

凡手指跌撲打碎者、用雞子黃油潤、次掞封口藥、外以散血膏敷貼、若咬傷者、用澤蘭散敷之、

凡胸脯骨有拳槌傷、外有腫、內有痛、外用定痛膏

敷貼內服破血利藥

凡肚皮裂開用麻縷為線或桑白皮為線以花乳石敷線須從裏面縫外面皮不可縫留為掞藥用封口藥塗或補肌散以鷄子清調敷

凡陰囊被人扯脫者用鷄子黄油塗以金毛狗脊毛薄攤於上次掞封口藥又用散血膏敷貼

凡陰囊處有青黑紫色腫者用補肉膏敷貼或用定痛膏加赤芍草烏良薑肉桂各少許打和用韭葉搗爛同藥敷貼如無韭葉葱葉亦可仍服利小

便藥

凡骨碎斷或未碎斷但皮破肉損者先用補肌散填滿瘡口次用散血膏敷貼如骨折者要接骨膏敷貼夾縛或皮破骨斷者用補肉膏敷貼

凡筋斷者用楓香以金沸草擣取汁調塗次用理傷膏敷貼

凡用夾須攤藥於紙上平兩頭要帶薄搭頭搭得不厚不磯肉平坦者無高低不均之患若四岸高低不均此上便有空缺不着肉處即生泡切記之

凡敷貼接骨等膏藥仍疼痛不止者可加乳香沒藥楓香白芷肉桂南星獨活等味各量加些於藥中敷貼其肉溫煖疼痛即住加刀斧傷者去肉桂南星獨活

凡刀斧傷者看輕重用藥如輕者只用補肌散掞重者宜用封口藥掞緊縛住如傷最重者外用敷血膏敷貼

凡被杖打腫痛而未破者先用稜針挑出黑血若已破者不須出血只用撒地金錢山薄荷地薄荷

生地黃、猪母腸葉、澤蘭葉、血見愁、搗爛敷貼。

凡治刀斧金刃、打撲、從高跌墮、皮肉破損而傷重者、中間用封口藥掞破處、或補肌散亦可。其四邊用截血膏箍住、使新血不來潮、此秘傳之妙訣也。

凡用敷貼等草藥、皆要臨時生採新鮮者用之有効。如出遠路、討不便者、可為末用、然終不及生採者為勝。如無草藥討處、就用君臣藥接縛之。

愚按草藥皆本草所載、故並錄無遺、備於窮鄉僻壤、亦可選而用之、其効一也。

二字藥

痺藥　凡接骨入臼先用此藥服之軟其筋骨

猴薑即骨碎補　香附各二錢　艸烏錢半　川芎一錢

右共爲細末每用薑酒調服飲醋即解

麻藥　凡整骨取箭頭服之不知痛

草烏三錢　當歸　白芷各二錢半

共爲細末每服五分熱酒下飲甘草湯解或白糖

湯冷服亦解

三字丸

嵱峒丸　治跌打損傷瘀血奔心昏暈不省及一切無名腫毒昏困欲死等症

京牛黃　冰片　麝香各二錢五分　天竺黃三錢

雄黃　阿魏各一兩　川大黃　兒茶

瓜兒血竭　三七各三錢　乳香　沒藥各二兩

藤黃二兩隔湯煮十數次去浮沫用山羊血五錢拌晒如無山羊血以子羊血代之

以上十三味共為細末將藤黃化開為丸如芡實大若乾稍加白蜜丸之外用蠟封固內服用無灰酒送下外敷用茶滷磨調忌一切生冷發物

里東丸　此方乃少林僧所傳紬繹是方都用血肉靈動之藥蓋草木具無形之氣不足以治形傷也五靈脂受五行之靈氣迅入肝經用以利氣行血退腫接骨番木鼈刑傷者必腫腫則氣凝血死用以解破處之血熱消形傷之結腫穿山甲寓水而食穴陵而居用以出陰入陽走竄經絡迅達傷處竝蚓上食稿壤下飲黃泉用以從陽入陰取蚓毒攻絡內之瘀更取蚓性逐水鮮熱消腫四者功專外消結腫分兩獨重者治傷綱領之藥也黃麻灰用

以破血利小便行傷接骨麝香通關入腎用以外通百竅內透骨髓乳香入心經言諸痛皆屬心火用以護心托裏安神定痛芸香性燥入脾用以勝腠理之濕排膿止痛強筋骨生肌肉古文錢跌撲損傷者用半兩五銖折傷必然肉敗用以腐蝕壞肉自然銅性燥破血用以逐敗惡之血六者去瘀生新安神定痛分兩次之治傷之條目也草烏外風襲入破傷之處即爲破傷風用以祛經之風從表而出全蠍外風襲入內風必從用以直攻破損

之處消散内風二者非防微杜漸亦析傷中所必有之證也當歸補營血用以去瘀生新京墨灰濇能固衛氣用以生肌膚合傷縫二者各具收成之理統論全方雖非捏經定證然其調治折傷之法井井有條先退腫後定痛腐其壞肉去其惡血祛其風活其血俾經脉流通則血氣調暢脂膏流着傷處其骨自接

五靈脂 炒醬色為度九兩五錢五分　穿山甲 炒黃焦二兩五錢

地龍 韭菜地者佳將滚湯泡熱在日内晒乾不乾在火上焙乾不得煳度九兩五錢

番木鼈用麻油在銅杓内煎滚放在内約二沉二浮即好十兩　麝香三錢三分

黄麻灰用麻切碎貯陽城鑵内隨泥封固鑵頭以大火煅存性三兩　芸香二兩五錢

古文五銖錢火煅醋淬十七箇　乳香去油一兩二錢五分

自然銅火煅醋淬二兩　草烏去皮尖炒三錢五分

全蠍去尾上鈎一兩二錢五分　當歸酒洗一兩二錢五分

京墨陳久者佳火燒烟盡爲度二錢五分

右酒糊爲丸硃砂爲衣蠟丸永久不壞每丸一錢五分重好酒送下清晨服時先略飲食然後用藥即下部傷亦食後服

玉壺丸　治痰厥頭痛眩暈

白麪三兩　生半夏　生南星各一兩　天麻五錢

白朮五錢　雄黃三錢半水飛

右爲末薑汁和丸如梧桐子大每用三十丸用水一盞先煎沸下藥煮至五七沸候藥浮漂出放溫別以生薑湯吞下食後服

沒藥丸　治打撲筋骨疼痛或氣逆血暈或瘀血內停肚腹作痛或胸膈脹悶等症

沒藥　乳香　川芎　川椒

芍藥　當歸　紅花　桃仁
血竭各一兩　自然銅四錢火煅醋淬七次
右爲末用黄臘四兩熔化入前末速攪匀丸彈子
大每服一丸酒化服

補筋丸　此丸耑治跌撲踒閃筋翻筋攣筋脹筋粗筋
聚骨錯血脉壅滯宣腫青紫疼痛等症
五加皮　蛇麻子　好沉香　丁香
川牛膝　白雲苓　白蓮蕋　肉蓯蓉
菟絲子　當歸酒洗　熟地黄　牡丹皮

宣木瓜各一兩　懷山藥八錢　廣木香　人參各三錢

共爲末蜜丸三錢大無灰好酒送下

踈血丸　此丸止血開胃

百霜草三錢　阿膠蛤粉炒成珠　藕節　側柏葉

茅根　當歸酒洗各一兩

共爲細末煉蜜爲丸如梧桐子每服五錢早晚老

酒送下

潤腸丸　治跌打損傷或脾胃伏火大腸乾燥或風熱

血結等症

麻子仁一兩 桃仁一兩去皮尖 羌活 當歸尾
大黃 皂角刺 秦艽各五錢
右為末煉蜜丸桐子大猪胆汁丸尤妙每服三五
十丸食前白湯送下

江鰾丸 治破傷風入裏驚而抽搐臟腑秘澀等症
天麻 雄黃各一錢 蜈蚣一条 江鰾
野鴿糞炒 殭蠶炒各五分 共研細分作兩一半飯
丸如桐子大硃砂為衣一半加巴豆霜二分五釐
飯丸不加衣每服二十丸加有巴霜一丸二服加

二丸白湯送下以利爲度再服硃衣丸病愈即止

應痛丸　治折傷後爲四氣所侵手足疼者

破故紙　骨碎補去毛　蒼朮生用　草烏各半斤

穿山甲去膜桑柴灰炒起泡爲度砂炒亦可　舶上茴香炒各六兩

右除草烏用生薑一斤搗爛淹兩宿焙乾與衆藥

共爲末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服五十丸

用酒或米湯送下忌熱物片時

三字散

乳香散　治打傷手足疼痛不可忍者

乳香 沒藥各三錢另研 肉桂五錢 白芷二錢

白朮炒 當歸炒 粉甘草各五錢

右爲細末研勻每服二錢不拘時酒調下

急風散 治新舊諸瘡破傷中風項強背直腰反折口噤不語手足抽掣眼目上視喉中鋸聲並皆治之

草烏三兩半燒存性 生黑豆二錢半 麝香五分另研 硃砂一兩

右爲細末每服酒下一錢如出箭頭內服外敷

一字散 治破傷風

草烏 天麻各五錢 香白芷三錢 全蠍一錢

金頭蜈蚣一条去頭足炙 右爲細末每服半錢如發熱茶清調下發寒溫酒調下不拘時服

八釐散 治跌打損傷等症功能接骨散瘀

蘇木麸一錢 半兩錢製一錢 自然銅製三錢 乳香三錢

沒藥三錢 血竭三錢 紅花一錢 丁香五分

麝香一分 番木鱉一錢油煠去毛

共爲細末酒服童便亦可

又方 江湖方姓所傳蓋亦經驗良方也

土鱉蟲焙末 乳香去油 沒藥去油 血竭各一錢

生半夏大者　當歸酒浸　巴豆霜　砂仁

香甜瓜子　雄黃各五分共爲細末收貯聽用每服八釐好酒調下小兒三釐凡傷損垂危但能開口服下即得活矣歌訣云此方八仙傳授千金世上難尋止疼止痛效如神接骨續筋立應不問外感苦楚那宮內損伶付八釐一服保安寧須臾便得活命

千里散　治破傷風寒熱拘急口噤咬牙等症

用行遠路騾蹄心以陰陽瓦火上煅存性研細每服三錢熱黃酒沖服

雄鼠散　治破傷風邪在表者

活雄鼠一枚用鐵絲縛繞陰陽瓦煅存性研爲細

末作一服熱黃酒調下

星風散　治破傷風表證能捜風發汗

南星　防風各二錢五分　蜈蚣二条　江鰾三錢

共研細末每用二錢黃酒調服一日二服

榆丁散　治破傷風證在半表半裏者

地榆　紫花地丁　馬齒莧　防風各五錢

共研細末每服三錢溫米湯調下

安髓散　治腦陷頭疼

川芎　白芷　香附製

各等分薑汁和酒服

固齒散　治牙齒損動

骨碎補　牡鼠骨煆灰

共研末收貯聽用

住痛散　此藥辛香治氣壅疼痛

杜仲　大茴　小茴

等分共爲末每服二錢

止血散　此藥止血生肌立効

狗頭骨灰　黃丹　蜜陀僧　血竭各一兩

石灰二升 生地黄 青蒿二汁和作團火煅亦研

右爲末遇傷處敷之

消風散 此陳氏治跌打損傷之開手方也用者審之

人參 防風 川芎 厚朴

南星 半夏 桔梗 肉桂各一錢

當歸 黄芩 白芷各二錢 羌活

獨活各錢半 柴胡七分 甘草三分

加童便煎服 一方多蟬蛻錢半殭蠶二錢

定痛散 治跌打撲傷定痛消腫舒筋和絡

當歸　川芎　白芍　官桂各一錢
三奈三錢　升麻　防風各一錢　紫丁香根
紅花各五錢　麝香三分
共爲細末老葱汁調合敷患處再用炎熨法其方
在後三字法

舒筋散　治閃挫血滯腰痛
玄胡索　當歸　桂心
三味等分爲末每服二錢溫酒調下空心服或加
牛膝桃仁續斷亦効

七釐散

治跌打損傷骨折筋斷重者先用燒酒服七釐不可多再用燒酒調敷傷處輕者只須調敷傷處如金刃割傷及割斷食喉血流不止急用此藥乾摻不須雞皮包紮立即止血定痛真有起死回生之效（方出京都汪順之同仁堂二家○方進士七釐散用土鱉蟲煅研為末酒服）

血竭（三兩二錢）　兒茶（八錢）　乳香　沒藥

紅花（各五錢）　片硃砂（四錢）　麝香　冰片（各四分）

右藥研極細末和極勻用瓷瓶收貯黃蠟封口端午午時誠製更妙藥雖平淡功極神速

四聖散　治跌打疼痛等症方係陳鳳占先生口授

草烏　白芷　山柰　當歸

等分爲末量人强弱或八分一錢酒下愼毋多服

鐵扇散　此方乃明大中丞德得於山右盧醫

老材香即山陝等省年久朽棺内松香黃瑩謂之老材香如無以陳年石灰代之

寸柏香即黑松香各一兩與寸柏香同溶化攪勻松香須入冷水取出晾乾

象皮五錢切薄片焙黃色以乾爲度勿令焦　龍骨五錢上白者生研

枯礬一錢

以上六味共研細貯瓷瓶内遇有刀石傷破用藥

敷傷口以扇向傷處搧之立愈忌卧熱處如傷處

發腫煎黃連水用鵝毛蘸塗即消

臭科散　王寅東傳接骨

臭科子　一名蠶地風草用條上嫩皮焙乾研細

每服空心酒調二錢即愈過身俱傷者二服亦愈

此草即今人地界溝邊所植者叢生高四五尺莖

粗如指葉似繡球花葉

慈雲散　畢峻功　治跌打損傷接骨回生及癰疽疔腫大

毒初起即消已成即潰功效如神

番木鱉　川烏　土鱉蟲　鹿角煅各二兩

穿山甲一兩六錢　明天麻　草烏　川芎

升麻　當歸尾　鬧陽花　生香附

殭蠶各一兩　蜈蚣　斑毛各四錢

右各製畢研極細末重者服一錢輕者用六分或八分俱用無灰酒調服蓋被取汗不可見風必須汗乾然後出幃幙

急救散　周鶴儂方　治跌打損傷

當歸尾酒洗　自然銅醋製七次　桃仁去尖　紅花各七錢

陳麻皮三錢　土鱉蟲酒洗浸焙五錢　骨碎補酒蒸
大黃各二錢　乳香去油　沒藥去油　老麖骨
血竭　硃砂　雄黃　麝香各五分
以上共為極細末收貯勿洩氣如遇跌死打死尚
有微氣者用酒調二厘入口即活如骨折瘀血攻
心用藥八釐酒灌之其傷自愈神効之極
調氣散　治昏暈者以淡鹽湯灌醒然後服此調其氣
木香　烏藥　厚朴薑製　白芷
青皮　杏仁去皮尖　蒼朮米泔水浸炒　陳皮

前胡　桔梗　甘草稍

右加薑棗水煎服後方可服接骨丹

玉龍散　治跌打損傷昏暈而骨未碎者神效

人中白一味醋煅七次用酒冲服又名接骨丹以

上二方出劉青田秘本

黑龍散　治跌打損傷筋骨碎斷等症

土當歸二兩　丁香皮六兩　百草霜六兩　炙山甲六兩

枇杷葉半觔

右共爲細末薑汁調敷患處然後用夾縛

土龍散　治打傷將死神效

白頸蚯蚓（不拘多少去土洗淨焙乾研末）

每服二錢葱薑湯下衣被蓋暖出汗即愈亦治痛風

內補散　一名當歸散又名蓯蓉散治金瘡去血多虛竭此藥內補

肉蓯蓉（四兩酒浸一宿去皮炒乾）　厚朴（去粗皮用薑汁炙令香熟）

人參　黃芪（各一兩）　白芍藥　黃芩

吳茱萸　乾薑（炮）　當歸（微炒）　川芎

川椒（去目炒出汗） 桂心 桑白皮 炙甘（各五錢）

右爲細末每服二錢食前溫酒調下日三四服一方有白及無黃芩桑白皮

內塞散 治金瘡去血多虛竭疼痛羸弱內補

黃芪 當歸 白芷 芎藭

乾薑 黃芩 芍藥 續斷

細辛 鹿茸（酥炙各二兩） 附子（五錢）

右爲細末每服五分匕食前酒調下日三服稍增至方寸匕一方無芍藥

百草散　治金瘡

凡一切金瘡出血傷折即時以藥封裹使牢勿令轉動不過十日即瘥不腫不膿不畏風若傷後數日始得藥須暖水洗令血出然後傅此藥大驗平時宜多合以備倉卒金瘡之要

五月五日任意採取百草不得回頭採回得百草入臼內擣爛如泥量藥多少以意入石灰和勻取出拍成餅日中曝乾遇用旋取撚碎若刀斧傷乾傅以血止為度湯火傷冷水調開塗傅蛇蝎犬鼠

咬傷先以溫水洗淨以津唾調塗疥瘡先抓破以藥末乾貼濕瘡以醋調傅其效如神

退熱散　治跌磕打傷手指身發寒熱者

山布瓜根　多景天草　澤蘭葉　地薄荷

魚桐根皮

右搗爛冷縛傷處大退身上寒熱

一赤散　治傷損傅藥後起疱者以稜針挑破摻末

大黃　赤石脂　石膏（煆各等分）

右研爲細末摻之

一黃散　治打撲傷痕紫黑有瘀血流注有熱者

大黃

右爲細末薑汁調溫敷

一白散　治打撲傷痕紫黑有瘀血流注無熱者

半夏

右爲細末薑汁調敷

一紫散　治傷損眼胞青黑紫色腫痛

紫金皮童便浸七日晒乾　生地黃各等分

右共搗爛茶清調勻傅貼

一緑散　治打撲眼胞、赤腫疼痛、

芙蓉葉　生地黄各等分、

右搗爛敷貼、或爲細末、雞子清調勻敷之、

走馬散　治折傷接骨、

骨碎補去毛、　皂角　柏葉　荷葉俱生用

右各等分爲末、先將折傷處揣定、令入原位、以薑汁調藥如糊、攤紙上、貼骨斷處、用杉木片夾定、以繩縛之、莫令轉動、三五日後開看、以温葱湯洗後、再貼藥、後夾七日、如痛、再加没藥、

補肌散　此藥止血除痛辟風續筋骨生肌肉
地黃苗　地松　青蒿　蒼耳苗
赤芍藥各五兩水煎取汁　生艾汁三升
右擇五月五日七月七日午時修合以前藥汁拌
石灰陰乾入丹三兩更研爲細末凡有折傷出血
用藥包封不可動約十日可瘥不腫不膿

通關散　治卒中塞閉握手咬牙不省人事用此搐嚏
牙皂　細辛
二味等分爲末吹鼻以驗肺氣

聖神散　治跌打損傷一切血瘀疼痛

淮烏即草烏　白芷　赤芍　白及

秋葉　枇杷葉　韭菜根各一兩

共搗末蜜調敷

如神散　治挫閃腰痛

玄胡索　當歸　桂心　杜仲薑汁炒

各等分共爲末每服二錢溫酒調下

黑神散　治顛撲迷悶

黑豆去皮炒半升　熟地黄酒浸　肉桂　當歸

乾薑　甘草　白芍藥　蒲黃各四兩

右為末每服二錢酒半盞童便半盞煎服

又方　治夾縛傷起泡者

百草霜不拘多少炒令烟盡存性清油調敷

活血散　治刀鎗傷腹裂腸出者

黃芪　當歸　川芎　白芷

續斷　赤芍　鹿茸　黃芩

細辛　乾薑　附子炮

各等分為末每服三錢温酒調下日三服立瘥

佛手散　治妊娠胎動子死腹中腸出在外等症

川芎　當歸

煎服一名芎歸湯

托裏散　治金瘡杖瘡及一切瘡毒因氣血不能成膿或膿成不能潰斂膿水清稀久而不瘥者

人參一錢氣虛者倍用　黃耆鹽水拌炒一錢

白朮炒七分　陳皮七分　當歸身酒拌　芍藥酒炒

熟地黃　白茯苓各一錢　水煎服

百合散　治瘀血入胃嘔吐黑血

川芎　當歸　百合　丹皮
生地黄　犀角　黄連　大黄
黄芩　側柏葉　赤芍　荆芥
鬱金　梔子　水煎加童便服

立安散　治挫閃氣滯腰痛
白牽牛炒頭末半生半熟二　當歸　肉桂
玄胡索　杜仲炒　茴香炒各二　木香五分
右爲細末空心酒下兩匙

清胃散　治血傷火盛或胃經濕熱唇口腫痛牙齦潰

爛或發熱惡寒等症

生地黃　黃連　當歸　丹皮各五分

升麻一錢

右水煎服如痛未止黃芩石膏大黃之類可量加

獨聖散　治血凝氣滯

薑製香附子一味搗末每服三四錢

雙解散　治損傷挾有外邪以解表解裏和血調氣故

曰雙解

麻黃　防風　荊芥　薄荷

川芎　白术　甘草　黄芩
梔子　連翹　當歸　芍藥
石膏　滑石
加生薑葱白煎服加硝黄即防風通聖散
五苓散　此利濕之劑也
猪苓　茯苓　澤瀉　白术
肉桂　用水煎服
五積散　此發表温裏之劑也
白芷　陳皮　當歸　厚朴

川芎 芍藥 茯苓 桔梗
蒼朮 枳殼 半夏 麻黃
乾薑 肉桂 甘草
加薑葱煎服

澤蘭散 治跌咬所傷及梏傷
芙蓉葉 澤蘭葉 地薄荷 白佛桑葉
耳草葉 右擣爛敷傷處留口通氣

地龍散 治瘀血在太陽經令腰脊痛
羌活二錢 獨活 黃柏鹽酒炒 甘草各一錢

蘇木六分　麻黄五分　地龍焙　肉桂各四分

當歸稍二分　桃仁六箇　右剉作一貼水煎服

蓽茇散　治顱骨傷牙車緊急嚼物艱難者

蓽茇　良薑　細辛各一錢

用水三鍾煎一鍾漱口

鷄鳴散　治從高墜下及木石所壓瘀血凝積痛不可忍並宜此藥用杏仁者因血入氣分故也

大黄一兩　杏仁廿一箇去毛尖并雙仁者另研

右爲細末酒煎去渣鷄鳴時服至曉下瘀而愈

失笑散　治血瘀腹痛。

蒲黃半生半炒　五靈脂研去砂　等分為末每酒下二錢

白金散　治刀箭傷瘡。

香白芷稍　為末清油調敷。

桃花散　此藥止血住痛去腐生肌。

千年石灰搗碎為末水漂　大黃煎汁拌入灰內。

共炒再研水飛過方可用愈陳愈妙。

又方　治金瘡血出不止生肌長肉方出景岳全書。

漂廣丹研　軟石膏煆研。

各等分和勻摻之甚妙

玉燭散　耀山曰此方治血虛秘結之下藥也

生地黃　當歸　川芎　赤芍藥

大黃酒浸　芒硝　引用生薑水煎服

玉真散　治破傷風及損傷項強口噤欲死又名定風散

天南星湯泡七次　防風各等分南星得防風制其毒不麻

右爲末先以熱童子小便洗淨瘡口拭乾摻之良久渾身作痒瘡口出赤水是其効也又以溫酒調

下一錢如牙關緊閉腰背反張用藥二錢童子小便調服心頭溫者急灌之亦可救累用累効

止痛散　此散止痛消腫活血通經辟風驅寒

鐵線透骨草二錢　防風　荊芥

當歸　蘄艾　丹皮　鶴虱

升麻各一錢　赤芍藥　苦參各二錢　川椒

甘草八分

共為末裝白布袋內紮口煎滚薰洗

卓香散　治跌打損傷潰爛及接骨換膏洗之

防風　荊芥　寄奴　獨活
大茴　明礬　倍子　苦參
柏葉　當歸　白芷　澤蘭
細辛　銀花　蒼耳

右各少許水煎加鹽一撮洗之

三字膏

萬靈膏　治跌打損傷消瘀散毒舒筋活血止痛接骨如神兼去麻木寒濕風痛等症

鸛筋草　透骨草　紫丁香根　當歸酒洗

自然銅醋淬七次 瓜兒血竭 沒藥各一兩 川芎八錢
赤芍二兩 半兩錢一枚醋製 紅花一兩五錢 川牛膝五錢
五加皮 石菖蒲 茅山朮各五錢 肉桂
木香 附子 半夏 石斛
萆薢 鹿茸各三錢 虎脛骨一對 麝香二錢
右除血竭沒藥麝香三味各研細末另包外共二
十一味先將香油十觔微火煨浸三日然後將群
藥入油內熬黑爲度去滓加黃丹五觔再熬至滴
水成珠離火俟少時將血竭沒藥麝香下入攪勻

取起出火氣

混元膏　治打撲損傷骨碎筋翻瘀血凝聚消青紫腫痛等症

羚羊角五錢　沒藥五錢　漏蘆三錢　紅花三錢

大黃二錢　麝香三錢　升麻三錢　白及五錢

生梔子二錢　甘草二錢　雄黃五錢　白歛三錢

右爲細末用高醋熬成膏調敷

迴陽膏　治跌打所傷爲敷涼藥或人元氣虛寒腫不消散或不潰歛及癰堅硬肉色不變久而不潰或

筋攣骨痛一切冷症並効

南星煨　白芷　軍薑炒　赤芍炒予一兩

草烏二錢　肉桂五錢

右共爲末葱湯調塗熱酒亦可

當歸膏　治杖樸湯火瘡毒不問已潰未潰肉雖傷而未壞者用之自愈肉已死而用之自潰新肉自生搽至肉漸白其毒始盡生肌最速殊有神効蓋當歸生地麻油黃臘主生肌止痛與新肉相宜也

當歸一兩　生地黃一兩　麻油六兩　黃臘一兩

右先將當歸生地黃入油煎黑去柤入蠟溶化候冷攪勻即成膏矣白蠟尤妙

太乙膏　耀山云與上方相同治傷口不合貼之生肌長肉消腫去腐神効無雙太乙者無上之稱也

香麻油　當歸　生地黃　甘草

右三味入麻油内煠枯去渣再以絲綿濾淨再入淨鍋内熬至滴水成珠取起少傾入飛過黃丹或鉛粉亦可熬成膏軟硬得中再入白臘黃臘少許再加去油乳香没藥攪勻收貯過三日去火毒用

紙攤貼其煎膏分兩法則大抵一觔油六兩煎藥爲則多則碍油少則無効其收膏之丹粉要審冬夏暑分增減一觔熟油夏則六七兩冬則五六兩如老硬加熟油若嫩軟加蠟亦可

烏龍膏 此膏治跌打損傷筋斷骨折青紫腫硬

百草霜三錢 白及五錢 白斂三錢 百合五錢
百部三錢 乳香五錢 沒藥五錢 麝香一分
糯米一兩炒 用陳小粉四兩隔年者佳炒黑
共爲末醋熬成膏

玉紅膏　治金瘡棒毒潰爛肌肉不生者乃收斂中之
神藥也
當歸二兩　白芷五錢　甘草一兩二錢　紫草二錢
血竭　輕粉各四錢　白占二兩　麻油一觔
先將上四味入油內浸三日漫火熬至藥枯去渣
濾淨次下白蠟血竭輕粉即成膏矣

地黃膏　治眼被物撞打腫痛昏暗
生地黃汁一合　黃連一兩　寒水石　黃柏各五錢
右三味為末和地黃汁成餅以紙攤貼眼上此膏

博極堂輯

非但撞打可貼即風熱赤眼熱淚出者皆可以用

芙蓉膏　治打撲傷損腫痛紫黑色久不退者

芙蓉葉二兩　紫荆皮　南星各一兩　獨活

白芷　赤芍藥各五錢

右爲末生薑汁茶清調溫敷如傷損紫黑色久不退者加肉桂五錢

定痛膏　治打撲傷損動筋折骨跌磕木石壓傷腫痛

芙蓉葉二兩　紫荆皮　獨活　南星生

白芷各五錢

右爲細末加馬齒莧一兩搗極爛和末一處用生葱汁老酒和炒煖敷

退腫膏　治一切破傷腫痛

芙蓉葉　地薄荷　耳草葉　澤蘭葉

金桐葉　赤牛膝　大黄另研各等分

右搗爛敷傷處中留一孔出氣

散血膏　治敷跌打損傷金瘡及虎傷獐猪牛咬傷

耳草葉又名猪獅蹄又名虎蹄蘇又名獅子蹄蘇生有狀葉如木棉葉　澤蘭葉

右各生採搗爛冷敷傷處先用金毛狗脊薄薄鋪

于患口以摻封口藥再貼此膏四圍用截血膏敷貼令血不潮

消腫膏　治胸脇跌傷腫痛動筋折骨

芙蓉葉　紫荊皮各五兩　白芷　當歸
骨碎補　獨活　何首烏　南星各三兩
橙橘葉　赤芍藥各二兩　石菖蒲　肉桂各五錢

右為末以薑汁熱酒調乘熱塗腫若動筋折骨加山樟毛銀藤皮及葉各五兩同前為末酒調煖敷縛定

又方　一名接補消腫膏治跌打損傷及虎狼等咬傷

耳草葉　雪裏開　水坊葉　烏芭葉

紫金皮

右為末以雞子清入桐油少許調匀敷貼

苣子膏　張日新傳接骨

萵苣菜子　桑白皮　榆白皮各四兩

右各焙為末用香油四兩熬滚先入苣子末次桑次榆熬至老嫩合式攤貼患處俟一炷香長時即

揭去藥則復原矣

紫金膏　治赤腫焮熱者

芙蓉花葉二兩白花者佳

右俱生採入生地黄同搗傅貼或爲末以雞子清入蜜少許和勻調入生地黄搗爛和傅

黄金膏　治跌打損傷筋骨斷落刀傷杖瘡湯火泡傷等症

麻油半觔熬至滴水成珠離火入白蠟黄蠟各五錢攪化再入籐黄一兩攪勻收貯此藥愈陳愈妙如收火膏老加熬過麻油燉化攪勻冷透敷之惟

刎頸者勿用因恐藤黄毒入耳

仙傳膏　治杖後重傷死血鬱結呃逆不食並夾傷內爛貼之可以起死回生

輕粉　血竭各二錢　樟腦二錢　冰片三分

麝香一分　乳香去油　沒藥去油各一錢五分

共研極細用豬板油一兩二錢黄蠟一兩同化調藥成膏攤貼患處晝夜流水即時甦醒

忍冬膏　治諸般腫痛金刃傷瘡并一切惡瘡

金銀花藤四兩　吸鐵石三錢

右藥二味用香油一觔熬枯去滓再熬至滴水不散入黃丹八兩成膏如常攤用

益母膏　能治打傷筋骨內損遇天陰則痛

益母草不拘多少陰乾

用水煎膏隨病上下食前後酒化服

木鱉膏顧氏家秘　治跌打損傷腫痛一切瘡瘍諸風症

真麻油三觔番木鱉一百四十七粒入鍋內熬至番木鱉黑脆為度熬時以柳枝頻攪將木鱉子撈起再入鉛粉炒黃色三十兩徐徐投下逐漸成膏

以缸成井水將膏傾入置露處出火氣一宿撈起
聽用攤後加後摻頭藥

摻頭藥

三奈　北細辛　川烏　樟氷

肉桂　當門子　大茴　母丁香

乳香去油　没藥去油　甘松　自然銅煅

半夏　大黃　華撥　皂角

乾薑　白芷　小茴香炒各五　阿魏三錢

右各忌見火即自然銅亦須放傾銀缸內煅透味

另碾合勻蜜貯勿洩香氣多少隨用可也如骨碎者不可多用麝香以其性熱而散能耗髓也若傷損血積齷齪者先貼無摻膏藥一個貼一二時辰揭起則傷口血跡被膏揭淨然後用摻藥之膏貼之倘無木鱉膏即尋常膏藥亦可用

松葱膏　治傷損

松香　研末

右杵搗成膏炙熱縛傷處先以生薑搗爛炒熱罨少時次以此膏貼之退腫住痛

截血膏

治跌打斫磕諸症能化血破瘀退腫止痛

天花粉三兩　片子薑黃　赤芍藥　白芷各一兩

右共為末茶調勻敷瘡口四圍　若頭面傷其血不止者急用此藥調塗頭上週圍　若手傷則塗臂上週圍　若傷足則塗腿上　若傷各處則塗瘡口四圍使截其血不潮如瘡口肉硬不消者此被風襲也可加獨活用熱酒調敷如又不消則風毒已深肌肉結硬加紫荆皮末和敷無有不消之理

補肉膏　一名理傷膏，治刀斧刃撲，肉破骨碎等傷。

黃蠟　猪油各四兩　乳香　沒藥各一兩

松香　麻油各一觔

右以折傷木皮一兩，搗碎入油內煎數沸，濾去粗，煎至滴水成珠，却入蜜陀僧、黃丹，慢火熬成膏，次入松香、黃蠟，熔化後入乳、沒，再加自然銅末，治骨折效。

接骨膏　此膏治骨碎筋斷，復續如初。

當歸七錢半　川芎煨　骨碎補各五錢　沒藥五錢

古文錢二箇火煅川烏四錢乳香二錢半木香一錢
松香六兩香油一兩
和油煎成膏攤貼患處

三字丹

麻沸丹 此丹接骨上髎拔箭飲之不知疼痛
羊躑躅三錢茉莉花根一錢當歸一兩石菖蒲三分
用水煎服一碗即人如睡寢任人整骨矣後以人
參五錢生甘草三錢陳皮五分半夏一錢白微一
錢石菖蒲五分茯苓五錢煎服即醒蓋羊躑躅專

能迷心茉莉根亦能使人不知用菖蒲引入心竅以迷亂耳用人参解之正氣盛則邪藥自解

保命丹　治跌打損傷接骨入臼

川烏　草烏各二兩二錢半均用泔水浸去皮　大黃一兩

五靈脂一兩　肉桂　木香　細辛

香附　延胡　三稜　莪朮

柴胡　青皮　枳實　桃仁

紅花　蘇木　大茴　小茴

歸尾　甘草　蜂房　蒲黃生

膺骨　土鱉　廣黄　三七各五錢
川椒二兩　廣皮一兩　烏藥七錢半　蚺蛇胆五分
血管鵞毛灰五錢
共爲細末煉蜜丸如龍眼大硃砂爲衣量病輕重
老壯用藥若病重與壯者服一丸如病輕與老弱
者半丸陳酒和童便化下

破血丹　治舌斷即截血膏也一名洪寶丹即抑陽散
也、

活血丹　治撲跌傷刀斧傷諸般風癱頑麻婦人血風

渾身疼痛等症、

青桑皮一觔、　當歸　牛膝　川芎

赤芍　熟地　黑豆酒煮　何首烏

南星製　白芷　松節炙　杜仲

破故紙　羌活　獨活　蒼朮

防風　荊芥　骨碎補　桔梗

續斷各四兩、　川烏　草烏　肉桂

木鱉　地龍　白斂　白及

細辛　降香　檀香　楓香

五靈脂　京墨　血竭　乳香去油

沒藥去油　大茴　松香以上各二兩

右為末，秫米醋煮糊為丸，彈子大，晒乾，以生漆抹手揶漆為衣，以袋盛，掛當風處，用時以當歸酒下。

塞鼻丹　此丹治跌打損傷，鼻中流血不止，神氣昏迷，牙齒損傷，虛浮腫痛者，及一切衄血之症，皆可用之。

硃砂　麝香　丁香　烏梅肉

川烏　草烏　三奈　當歸各一錢

乳香二錢 皂角七分

共爲細末用獨蒜泥爲丸以絲綿包裹塞於鼻中

接骨丹 治接骨入臼

鷙鳥骨三錢 麝香三分 乳香去油 沒藥去油

自然銅醋淬 銅末醋淬各二錢 土鱉蟲二十箇

用湖蟹兩隻搗爛糊爲丸重一錢大硃砂爲衣酒下鷙鳥骨即老鷹骨也蓋鷙鳥之力在骨詳見本草綱目接骨方

洪寶丹 即截血膏古之抑陽散也又名濟陰丹也

接骨丹

七炁罌口古屋上、廣漢前上層坐瓶年深者是用此銅鉎生剉末研之無聲水飛一錢

古文錢約五百年青良火煅醋淬七次研之無聲如韮者佳五分

右和匀每服七厘先用甜瓜子仁去殼三錢嚼爛吐出再服下清酒過口

古方選註云罌小口瓶也七炁者日月風雨露霜雪也火土結成堅剛性利復藉天之七炁能透骨入髓理傷續絕古文錢其半兩五銖出自秦漢紅銅者佳唐時開元錢亦可入藥功專腐蝕壞肉陳

藏器曰能直入損處銲人斷骨甜瓜子仁開腸胃之壅遏通筋骨之機關因丹藥釐數甚微助以入胃轉輸爲丹藥之嚮導也

玉樞丹　即太乙紫金錠又名萬病解毒丸治跌打損傷可作下藥能逐瘀血外敷蟲傷毒螫神效

毛茨姑 二兩紫色有毛鬚堅實者佳　紅芽大戟 切薄片取頭末一兩五錢

千金子 去殼去油淨末二兩　文蛤 二兩　硃砂

雄黃　麝香 各二錢　右爲細末以糯米粥搗勻印成錠子量人虛實服多少

紫金丹　治損傷定痛接骨

紅娘子　麝香　没藥各一錢半　烏藥

地龍去土　茴香　陳皮　青皮各二錢半

川烏炮　草烏各一兩炮　黑牽牛五錢生用　禹餘粮四錢

自然銅醋焠七次　威靈仙　金毛狗脊　防風去蘆

五靈脂去皮　木鼈子去殼　骨碎補各五錢

右爲細末醋糊丸如桐子大每服十丸至二十丸

溫酒送下病上食後服病下食前服

聖靈丹　治一切打撲損傷及傷折疼痛不可忍者並

宜服之

萵苣子大盞一盞炒取淨末二兩八錢　烏梅去核五箇　乳香五錢

白米一撮

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼熱酒吞下食後一伏時痛不止再服

接骨丹　治折骨出臼無草藥討處用此方効

南星生四兩　木鼈子三兩　紫金皮　芙蓉葉

獨活　白芷　官桂　楓香各一兩

乳香　沒藥各五錢　松香一兩

右為末米醋生薑汁各少許入酒調勻攤油紙上夾縛冬月熱縛夏月溫縛

火龍丹　治腰腹諸痛出集玄方

焰硝　雄黃各一錢

共為細末每點少許入眼眥內即愈

接骨丹

生鱉蟲火酒醉死焙乾二錢雌雄不拘　自然銅火煅醋淬十四次三錢

血竭三錢　骨碎補去毛五錢　當歸酒浸五錢　乳香去油五錢

硼砂二錢　大半夏製三錢

右爲細末每服八厘或一分酒服一方有半兩錢十文

續筋丹

土鱉蟲　三七　血竭　龍骨

右各等分爲細末用津唾調搽

活血丹　治跌撲損傷神藥

地鱉蟲燒酒浸死晒乾　桃仁去皮尖　山查

劉寄奴花頭　五加皮各四兩　香附童便浸炒　紅花

牡丹皮　牛膝肉酒洗　延胡索醋煮　當歸各三兩

蓬朮　山稜醋炒　枳實　檳榔
川芎　赤芍　降香　蘇木
威靈仙　凌霄花　青皮各二兩　乳香
沒藥去油各一兩　大黃八兩用陳酒煮晾乾
右各如法製度爲極細末每服二錢壯者三錢陳
酒送下核桃四五枚過口

透骨丹　治撲打損傷深入骨髓或隱隱疼痛或天陰
則痛或年遠四肢沉重無力此藥主之真神方也
鬧羊花子又名山芝麻火酒浸炒三次童便浸炒二次淨末一兩

乳香（不去油）沒藥（不去油）真血竭各三錢

各取淨末秤準和勻再加麝香一分再研瓷罈收貯封固每服三分壯者五六分不必用夜飯准要黃昏胠好方服酒可儘量送下吃葷用豬肉過口吃素用豆腐過口服後避風有微汗出為效忌房事酸寒茶醬等物及諸般血物若虛弱者間五日一服壯實者間三日一服以愈為度

活絡丹　治濕痰死血在手足間有一二點痛年久不愈者

川烏　草烏　南星　半夏
胆星　地龍灰酒洗煅
右爲細末丸桐子大每服七丸、

接骨丹　治骨折骨碎等症
自然銅火煅醋淬七次　古塚銅錢火煅醋淬、
右等分研爲細末傷重者服一二分多服則骨突出矣

九龍丹　治跌打損傷接骨神効瘍科選粹名接骨丸
龍丹

糞池內陳年磚頭洗淨火煅醋淬九次研細每服三錢或四錢極效

補損丹　治諸般傷損腫痛此丹能散血定痛

當歸　川芎　赤芍藥　生芐

白芍藥　牛膝　續斷　白芷

杜仲　骨碎補　五加皮　羌活

獨活　南星製　防風各一兩五錢　官桂

乳香　沒藥各一兩　南木香　丁皮

八角茴各五錢　右共為細末黃酒調服

勝金丹 即膏藥摻頭

麝香 花蕊石 象皮各三錢 血竭三兩

乳香 沒藥 海螵蛸 樟腦

人參 木耳灰 三七根 兒茶各一兩

古石灰 紫石英各二兩 自然銅 冰片

乾地虱 乾大糞 琥珀各一錢 生甘草五錢

土狗十箇

各研極細和勻磁瓶密貯每膏一張用末藥三錢

摻膏上貼之絕妙

四生丹　治跌打損傷如神、
黑豆炒去皮　蒲黄　當歸　桂心
赤芍藥　乾薑各八兩、茄種晒乾四兩、
擇天德月德日修合、忌生人鷄犬、碾細煉蜜爲丸
每服二錢、童便冲酒送下、

三字湯

獨參湯　治一切失血與、潰後氣血俱虛、惡寒發熱、作渴煩躁者宜用此補氣、蓋血生於氣、陽生陰長之理也、用人參二兩、棗十枚、水煎服、

四物湯　治一切血虛日晡發熱煩躁不安者宜服

當歸　熟地黃各三錢　川芎一錢五分　芍藥二錢

右水煎服加白朮茯苓柴胡丹皮亦名加味四物湯加巴戟大黃名巴戟湯治血閉臟腑嗜卧不食

八珍湯　治心肺虛損氣血兩虧等症

即四物湯與四君子湯相和爲劑也

聖愈湯　治金瘡杖傷膿血出多熱躁不安或晡熱作渴等症

熟地黃酒洗　生地黃酒洗　人參　川芎各一錢

當歸酒洗　黃芩各五分、

右水煎服、

歸脾湯　治跌撲等病、氣血傷損、或思慮傷脾、血虛火動、寤而不寐、或心脾作痛、怠惰嗜臥、或怔忡驚悸、自汗盜汗、大便不調、或血上下妄行、其功甚捷、

白朮　當歸　白茯苓　黃芪炙

龍眼肉　遠志　酸棗仁各一錢、木香五分、

人參一錢、甘草三分、

右加薑棗水煎、加柴胡山梔、即加味歸脾湯、治胸腹脹滿、飲食少思、肝脾氣滯等症、

芎歸湯　治血虛頭痛胎動下血子死腹中等症

當歸　川芎

水煎服若爲末服即佛手散也

參附湯　治金瘡杖傷失血過多或膿瘀大泄湯隨陰走上氣喘息自汗盜汗氣短頭暈等症

人參四錢　附子製三錢

右用清水煎服如陽氣脫陷者倍用之

白朮湯　治破傷風汗出不止筋攣搐弱者

白朮　葛根　升麻　黄芩

芍藥各二兩　甘草二錢五分

右每服五錢水煎無時服

葛根湯　治太陽無汗而惡寒拘急項強等症

葛根　麻黃　桂枝　芍藥

甘草　加生薑大棗水煎服

獨活湯　治勞役腰痛如折等症

獨活　羌活　當歸　連翹

防風　澤瀉　肉桂各一錢　大黃

黃柏　甘草各五分　桃仁留尖九粒

右剉一貼水酒各半煎空心服

羌活湯　治破傷風在半表半裏急服此湯稍緩即入裏不可用

羌活　麻黃　菊花　川芎

石羔　防風　前胡　黃芩

細辛　甘草　白茯苓　枳殼

蔓荊子各一兩　薄荷　白芷各五錢

右每服五錢水煎服

羌麻湯　即前方羌活湯之化名也

二陳湯　治一切痰飲爲病咳嗽脹滿嘔吐惡心頭眩
心悸等症
陳皮一錢五分　半夏製二錢　茯苓二錢　甘草五分
引加生薑水煎服
防風湯　治破傷風在表未入裏急服此藥
防風　羌活　獨活　川芎各一錢
右水煎調蜈蚣散服大効用蜈蚣一對鰾三錢爲
細末下
清燥湯　治跌撲損傷之症或潰後氣血俱虛濕熱乘

之遍身酸軟或夏秋濕熱太甚肺金受傷絕寒水生化之源腎無所養小便赤澁大便不調或腰腿痿軟口乾作渴體腫麻木或頭目眩暈飲食少思或自汗體倦胸滿氣促氣高而喘身熱而煩等症

黄芪一錢五分　蒼术一錢　五味子九粒　白术
陳皮　澤瀉　白茯苓　人參
麥冬　神麯　豬苓　酒柏各五分
生地黄　當歸身各一錢　柴胡　甘草
黄連各三分

右加薑水煎服若濕痰壅盛參芪歸地之類減之

甦氣湯　治從高墜下昏死不甦

乳香　沒藥　大黃各一錢　山羊血五分

蘇葉　荆芥　丹皮各三錢　當歸

白芍　羊躑躅各五錢　桃仁十四粒

水煎服此方醒氣活血兼用之故奏功神速妙在用羊躑躅與蘇葉荆芥因其氣亂而亂之則血易活而氣易甦矣愚按羊躑躅毒性太峻用五錢未免過多看患者强弱而酌減之

安神湯　治血氣虛而有火頭痛頭旋眼黑等症

黃芪錢半　羌活　黃柏酒浸一錢各　柴胡

升麻　生地黃　知母酒浸五分各　防風二分

生甘草　炙甘草各二分

右剉水煎數沸入川芎蔓荊子各三分再煎食後服

抵當湯　治下部瘀血大便不通代抵當湯方見作嘔

水蛭　虻蟲各三十枚　桃仁三十枚去皮尖　大黃一兩

水煎去渣取三升溫服一升不下再服

三字飲

香蘇飲　治外感頭疼發熱或魚肉傷等症

香附炒　紫蘇各二錢　橘紅一錢　甘草七分

加薑葱煎服

香薷飲　此散暑利脾之總劑也

香薷一兩　厚朴薑汁炒　扁豆炒各五錢　黃連薑製三錢

冷服

柴胡飲　治大怒及從高墜下血積肋下左邊疼

柴胡五錢　紅花三錢　大桃仁不去尖三錢研末

右將柴胡紅花用酒煎好調桃仁末熱服

藍汁飲　治毒箭所中

右搗藍葉汁一升飲之其渣敷於瘡上若無藍取新青藍布絞汁服之并淋瘡中

三字子

紅散子　摩金瘡上出箭頭

草烏尖　麒麟竭　蔓陀羅子　茄子花

蓖麻子去殼細研 各五錢

右爲細末好酒調和膏塗瘡口上箭頭自出

黄末子　治打撲傷損骨折筋斷瘀血腫痛及癱瘓頑痺四肢痠痛一切痛風等症

川烏炮　草烏醋煮炒　降眞香　楓香

肉桂　松香　薑黃　乳香

沒藥　細辛各五錢　當歸　赤芍

羌活　獨活　川芎　蒲黃

白芷　五加皮　桔梗　骨碎補

蒼朮　何首烏　川牛膝各一兩　片薑黃一兩

右為末酒調下將愈加自然銅折骨者便可用之

如無折骨初不宜加自然銅

白末子　治證同前

白芷　南星製　白朮　何首烏

桔梗　羌活　獨活　白芍藥

白楊皮　川芎　白茯苓　白歛

當歸　薏苡仁炒　骨碎補　牛膝

續斷　川烏炮　細辛　肉桂

乳香　沒藥各一兩

右末酒調下欲好之際加自然銅製一兩只折骨

者便可用之、

紅末子　治證同前、

獨活　何首烏　南星製　白芷
羗活　當歸　骨碎補　蘇木
牛膝　赤芍藥　紅花　川芎各二兩、
細辛　川烏製　桔梗　降眞香
楓香　血竭　乳香　沒藥各一兩

右末酒調下、欲好之際加製自然銅一兩只折骨
者便可用之、

黑末子　治證同前

雄雞毛燒　桑炭　老松節炒存性　側栢葉炒

嫩松絲炒各四兩　當歸　牛膝　何首烏

黑豆炒　南星製　骨碎補　熟地黃

羌活　獨活　赤芍藥　川芎

白芷各二兩　細辛　肉桂　川烏炮

草烏製　木鱉子　南木香　五靈脂

降真香　乳香　沒藥　楓香各一兩

百草霜五錢

右末熱酒調下欲好之際加自然銅製一兩只折骨者便可用之

三字藥

清心藥 治打撲傷損折骨出臼及肚皮傷破腸出者

牡丹皮 當歸 川芎 赤芍藥

梔子 生地黃 黃芩 黃連

連翹 甘草

右引用燈心草薄荷煎入童便和服

止痛藥 治打撲傷損折骨出臼又金瘡破傷等症

當歸　牛膝　川芎　生地
赤芍　白芷　羌活　杜仲
獨活　續斷各一兩　肉桂　大茴
乳香　血竭各二錢半　沒藥　木香
丁皮　沉香各五分　共爲細末老酒調服

洗傷藥　此藥薰洗損傷等處

荊芥　土當歸　生葱

共煎膿湯薰洗傷處或生葱一味煎洗亦妙、

又方

劉寄奴　猴薑　紫蘇葉　紅花

凿白草　青蔥　甘草各一兩

前水盈盆令被傷人穩坐盆内週圍圍之上面遮蓋不可透風薰透侍溫淋洗疼痛如失

又方

南獨活三兩　地骨皮二兩六錢　骨碎補一兩二錢　五加皮

透骨草　川續斷各一兩　羌活　食鹽各三錢

先用水十碗煎五碗渣用水八碗再煎四碗三次水六碗煎三碗四次水三碗煎二碗共入砂鍋内

煎滚薰洗神効

又方　出寶傳堂洗心集

乳香　沒藥各五錢　生軍一兩　生甘八錢

皮硝一兩　用陳酒煎好趁熱洗患處

又方

紫果子藤煎湯揉洗或用馬尾松毛熬湯薰洗

殺蛆藥　此藥治損傷潰爛生蛆者用皂礬煅赤掺於患處即化爲水佐以内服柴胡梔子清肝火並妙

又方　治跌打損傷時值暑天腐爛恐生蛆蟲外雖平

滿爲害不淺宜用猪血切片引出蛆蟲再用白蒺藜白斂貫仲共爲細末香油調敷其蟲即滅

金鎗藥　王蘭舟傳

乳香去油　沒藥去油各二錢　血竭二錢　兒茶二錢
龍骨二錢煅　象皮二錢土炒成珠　輕粉三錢　三七二錢

上共爲末再以陳年石灰一觔大黃二兩白芷一兩三味同炒成粉紅色研細加入前藥和勻貯瓷瓶內敷傷口神效

接骨藥　此敷圍之藥也

天南星　木鱉子炒各四兩　乳香　沒藥

肉桂各一兩

右爲末用薑一觔去皮搗爛取自然汁米醋少許白麵爲糊攤紙貼患處以帛纏之外用杉木皮夾之

刀瘡藥　治一切金刃所傷止血收口定痛護風

上白石膏一觔煆　淨板松香一觔水澄過

珍珠五錢豆腐煮

右三味共研細末和爲一處甆瓶收貯備用

封口藥　治跌打損傷皮開肉破及金刃傷割喉斷耳缺唇裂肚皮跌破陰囊皮碎等症大効

乳香　没藥　兒茶　當歸

杉皮灰各一錢　麝香五釐　氷片一分　豬䐁脿葉

一錢如無此葉葛葉毛藤子葉亦可

右各另研細末稱合和匀再研收用

止血藥　治金瘡血出

陳石灰八兩　黄連　黄柏　大黄各二兩

右將三黄漬濕同石灰炒令烟盡藥色如桃花者

去渣水澡淨研用

破血藥　治皮肉不破瘀血積滯內攻發譫宜用此攻利也若皮破血流宜作亡血過多治之

柴胡　黃芩　五靈脂　枳實

當歸　赤芍　川芎　生地

大黃　朴硝　桃仁　紅花

蘇木　右水煎加童便酒服

三字法

葱熨法　此法常以炎熨肉破血出諸傷先用老葱汁

合定痛散敷於患處上用榆樹皮着艾熨之蓋血液津漬潮潤故以樹皮隔之方可灸熨也瞿山云神効葱熨法治跌撲損傷用葱白切細杵爛炒熱敷患處如冷易之腫痛即止其効如神又治破傷風症極效

豉灸法　治瘀血凝注用江西豆豉一味爲末津唾和作餅子如錢大厚二分置患處以艾壯於餅上灸之如乾則再易

胆導法　治大便秘結用大猪胆一箇少和法醋將胆

縛如縛竹管于口持管棒入穀道胆上用力一擠則胆汁入穀道如一時傾當大便出宿垢惡物甚効。

四字丸

蘇合香丸　治跌撲迷悶并中風卒暴痰壅心痛昏厥鬼魅惡氣以此開之。

麝香　沉香　丁香　白檀香

香附　蓽茇　白朮　訶子煨去皮

硃砂水飛　青木香　烏犀角　薰陸香各二兩

安息香各一兩用無灰酒一升熬膏　蘇合油二兩入安息膏內
龍腦一兩
右爲細末用安息香膏和煉蜜爲丸每丸重一錢
蠟封尤妙或薑湯或開水送小兒疾篤鉤藤湯下

大活血丸　治打撲傷損折骨碎筋瘀血腫痛癱瘓頑
痺四肢痠痛一切痛風等症
青桑炭一斤　栗間　骨碎補　南星製
白芍藥　牛膝　川烏炮　黑豆酒煮各一兩六錢
自然銅製　木鱉子各八錢　細辛一兩

降真香節　楓香各三錢　乳香　沒藥

血竭各六錢

右末醋煮秫米糊為丸如彈子大以生漆為衣火藏不壞每用一丸無灰酒摩化服

四字散

麒麟竭散　治刀箭傷筋骨斷止血定痛

麒麟竭　白及各五錢　白斂　黃蘗

密陀僧　炙甘草　當歸炒　白芷各一兩

右為細末每用少許乾掺瘡上立効

紫金皮散　治打撲傷損金刃箭鏃傷處浮腫用此

紫金皮醋炒　南星　半夏　川當歸

黃蘗鹽炒　草烏炮　川烏炮　土當歸

劉寄奴　破故紙　烏藥　川芎

川牛膝　川白芷鹽水炒　桑白皮各等分

右爲細末生薑薄荷汁調敷腫處傷處有瘡口者四邊敷之如皮熱甚者加黃蘗皮生地黃

敗弩筋散　治金刃弓弩所中筋急不得伸屈

敗弩筋燒作灰　熟地黃焙　秦艽去苗　杜仲各半兩

附子炮去皮臍　當歸切焙各一兩　大棗三枚

右為細末、每服三錢匕、溫酒調下、空心日午夜臥各一服、一方有續斷、無大棗、

何首烏散　治跌打折傷初起宜服之、

何首烏　當歸　赤芍藥　白芷

烏藥　枳殼　防風　甘草

川芎　陳皮　香附　紫蘇

羌活　獨活　肉桂

右加薄荷生地黃入酒煎和服、痛甚者加乳沒、

牡丹皮散　治跌撲閃挫傷損瘀血疼痛

牡丹皮　當歸　骨碎補　紅花

續斷　乳香　沒藥　桃仁

川芎　赤芍藥　生地黃

右水和酒煎服

花蕊石散　治一切金瘡刃傷箭簇打撲重傷死血瘀積患處以藥摻之瘀化為水即生新血如內蓄瘀血腹中疼痛脹滿服之血化為水凡腹破腸出并陰囊皮破用線縫合必須摻以此藥否則恐作膿

潰之患其功不能盡述

花蕊石二兩　石硫黃四兩

右二味和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦甑一箇候乾入藥再用泥封口安在磚上畫八卦五行用炭火煅之候罐冷取出每服一錢童便調下薛氏云若被傷熾盛元氣虧損內有瘀血不勝跡導者用前藥一服其血內化又不動臟腑甚妙甚妙

又方　治同上方出洗冤錄表急救方

乳香　沒藥　羌活　紫蘇

蛇含石童便煅三次、　草烏　厚朴
白芷　細辛　降香　當歸
南星　輕粉　蘇木　檀香
龍骨各二錢　麝香三分、　花蕊石五錢童便煅七次、
右共研極細、罐收聽用、葱湯洗淨、用此掺之、軟綿札緊、一日一換、神效、

白膠香散　治皮破筋斷、
白膠香一味、研爲極細末、敷之、即楓脂香、今之芸香也、

人中白散　治閃挫跌撲傷極重者

人中白一味火煅醋淬七次爲末每服五分酒下

生地黃散　治眼被打撞腫痛

生地黃　川芎　羚羊角　大黃

赤芍藥　枳殼　木香各一錢

水煎食後服

石决明散　治目被撞打疼痛無時瞳人被驚昏暗濛

濛眼眶停留瘀血者并治肝熱眼赤脾熱瞼腫雞

冠蜆肉或蠏睛旋螺者俱效

石決明　草決明各一兩　羌活　梔子

青葙子　赤芍藥　荊芥　木賊

大黄各二錢五分。

右共爲細末每服二錢麥門冬湯下一名大決明散。

四字膏

金體神膏　治跌打損傷接骨入臼。

當歸　生地　紅花各二兩　牛膝

續斷　劉寄奴　地榆　茜草

木爪　小薊　人參　川芎
白朮　黃芪各一兩　甘草五錢　桑木枝四兩
杏仁　皂角　柴胡　荊芥各三錢
麻油三觔
熬数沸以麻布濾去渣再煎滴水成珠加入漂過黃丹一觔四兩收爲膏勿太老再用自然銅海螵硝乳香花蕊石各三錢沒藥二錢血竭五錢白蠟一兩爲末乘熱投膏中以桑枝棍攪勻取起以瓦器盛之

四字丹

續骨神丹

當歸二兩　大黃五錢　生地　龜板

白芍各一兩　丹皮三錢　桃仁三十箇　續斷

牛膝　乳香　沒藥　紅花各二錢

羊躑躅一錢

水煎服一劑瘀去生新骨即合矣又二劑去大黃

再服全愈按此方去瘀滯則新生然內羊躑躅一

味亦可輕服

接骨金丹 一名續骨丸蘇沈良方云方出小說所載有人遇異人得之每合以拯人無不應驗

辰砂　乳香去油　沒藥去油　血竭各一兩

自然銅　黃丹　蜜陀僧各四兩　白礬十二兩

白蠟八兩　豬板油十兩

先將豬板油入鍋熬化濾清復入鍋內熬下白蠟化盡離火放地上將陀僧黃丹自然銅攪勻後下再煎滴水成珠為度始下血竭乳沒明礬用柳枝不住手攪勻待凝丸如彈子大筍殼襯收凡遇跌打損傷重者用一丸再加豬油少許火上化開塗

傷處以油紙包縛如最重者以藥塗上燈草裹好外用竹片夾縛再用一丸作小丸用滚熱葱酒送下若仍痛再進一丸骨折者又用一丸如牙痛納於牙齦即止

又方　此即大梁孫都督所傳之一釐金方也

土鱉蟲一個焙黃　巴豆一粒去油　壓生半夏一粒　自然銅火煅

乳香去油　沒藥去油各五釐

共碾極細每用五釐滚酒調服約人行十里汗出其骨交接有聲忌發物房事一百二十天按此乃

攻劑也末必能表汗出、抑藉滚酒之力耳、

四字湯

四君子湯　治一切陽虛氣弱、脾衰肺損、飲食少思、脉來細軟等症、

人参　白术　茯苓　甘草

引加薑棗、水煎服、加陳皮名異功散、治脾胃不和、

六君子湯　治氣虛有痰、脾虛鼓脹等症、

即前四君子湯、加陳皮半夏也、

小柴胡湯　治一切撲損等症、因肝胆經火盛作痛出

血自汗寒熱往來日晡發熱或潮熱身熱咳嗽發
熱脇下作痛痞滿不舒
柴胡二錢　黃芩一錢五分　半夏　人參各一錢
甘草三分
右加薑三片水煎服如肝火盛加黃連山梔兩
脇熱痛者再加歸稍紅花因怒而痛者加芎歸青
皮枳殼之類

五加皮湯　此湯舒筋和血定痛消瘀

當歸酒洗　五加皮　沒藥　皮硝

青皮　川椒　香附子各三錢　丁香一錢
地骨皮一錢　丹皮二錢　麝香一分　老葱三根
右用水煎滚薰洗患處
海桐皮湯　常洗一切跌打損傷筋翻骨錯疼痛不止
海桐皮二錢　沒藥二錢　鐵線透骨草二錢
乳香二錢　當歸酒洗錢半　川椒三錢　川芎一錢
威靈仙　白芷　防風　甘草各八分
共爲粗末裝白布袋内紮口煎湯薰洗患處
小芎黃湯　治破傷風入裏猶有表熱者

川芎三錢　黄芩二錢　甘草五分

右用水煎服

大芎黄湯　治破傷風入裏大便秘小便赤自汗不止者

川芎一錢　黄芩　羌活　大黄各二錢

右㕮作一貼用水煎服以下之微利爲度

四字藥

整骨麻藥　此藥開取箭頭服之不痛

閙羊花倍用　胡加子　薑黄　川烏

草烏　麻黃各等分

右共爲細末每服五分茶酒任下欲解用甘草煎湯服之即甦

外敷麻藥　此藥敷於患上任割不痛

川烏尖　草烏尖各五錢　蟾酥四錢　胡椒一兩

生南星　生半夏各五錢

右爲細末用燒酒調敷一方加蓽茇一方加細辛

跌打膏藥　一名五香膏治諸損百病此家傳秘方也

川烏　草烏　山稜　蓬朮

當歸　生地　赤芍　大黄

川山甲　木鼈子　生南星　牙皂各二兩

密陀僧四兩研　鉛粉漂一觔　丁香研細末下同　肉桂

乳香去油　沒藥去　甘松　山奈

川芎　白芷　川朴　大茴各二兩

用桐油香油各二觔將前十二味先熬枯濾淨再熬滴水成珠入陀僧鉛粉熬成膏離火再加後十味再添麝香五錢攪匀收貯攤用孕婦忌之

傷科彙纂卷之七

終